

LA ALIMENTACIÓN DE LAS AVES

VEGETALES CUYOS FRUTOS SON CONSUMIDOS POR LAS AVES

Una investigación realizada por el Dr. Martín R. de la Peña, aplicando exclusivamente el método de la observación directa en los ambientes naturales.



El Chingolo es muy fácil de reconocer y permite ser observado a corta distancia. En su dieta incluye frutos de mora. Foto (E&N)



▲ **Fruta tinta** (*Rivina humilis*) (Phytolaccaceae)

Otros nombres: Inchiquil. Sangre de toro.

Características: Hierba erguida, de hasta 1 m. de altura. Las flores son blancas o rosadas. El fruto es redondeado, de color rojo. Mide de 4 a 6 mm. de diámetro. Florece y fructifica en el verano. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el centro del país.

Foto (Martín R. de la Peña)



▲ **Coco** (*Fagara coco*) (Rutaceae)

Otros nombres: Cocucho. Sauco hediondo.

Características: Árbol de 5 a 10 m. de alto. La corteza tiene agujijones. Hojas grandes, verde oscuras. Flores pequeñas, blanco verdosas. Fruto redondeado, de 5 a 7 mm. de diámetro. Morados cuando están maduros. Fructifica en primavera y verano. Se distribuye por el noroeste del país, hasta Córdoba y San Luís.

Foto (Martín R. de la Peña)



▲ **Mora** (*Morus alba*) (Moraceae)

Otros nombres: Mora blanca. Moral. Morera morada.

Características: Árbol de hasta 15 m. de alto. Hojas grandes, con los bordes aserrados. Las flores son verdosas.

El fruto mide hasta 2,5 cm. de largo. Es blanco, rosado o violáceo. Florece en primavera. Fructifica desde octubre a diciembre.

Foto (Martín R. de la Peña)



Un Jilguero Dorado, atento sobre la rama de un Ceibo.

A corta distancia había un árbol de mora que visitaba habitualmente para alimentarse de sus frutos.

Foto (E&N)

El Cardenal, un pájaro cuya belleza y docilidad lo hace ser perseguido y capturado para venderlo como mascota. En libertad suele alimentarse de los frutos de la mora y del tala salado. Foto (E&N)




Tala salada (*Grabowskia duplicata*) (Solanaceae)

Otros nombres : Tala del burro. Tala de burro. Micuna. Matorral. Guasnal.

Características: Arbusto muy ramoso, espinoso, de hasta 2 m. de alto. Flores blancas. Fruto globoso, redondeado, amarillo o anaranjado, de 5 a 8 mm. de diámetro. Florece y fructifica en primavera. Se distribuye por el noreste del país.

Foto (Martín R. de la Peña)





▲ **Pino** (*Ureca aurantiaca*) (Urticaceae)

Características: Arbusto erecto o apoyante, de 60 a 80 cm. de alto.

Hojas con pelos urticantes. Fruto globoso, anaranjado rojizo.

Se distribuye por el norte y noreste del país.

Foto (Martín R. de la Peña)



▲ **Naranjillo** (*Solanum chromotrichum*) (Solanaceae)

Otros nombres : Hediondilla del monte.

Características: Arbusto ramoso, de 1,5 a 2 m. de alto. Flores blancas. Fruto globoso, redondeado, de color naranja, de 5 a 6 mm. de diámetro. Florece en primavera y verano. Se distribuye por el noroeste y centro del país, desde Jujuy a Corrientes y Santa Fe.

Foto (Martín R. de la Peña)



Un Carpintero Real vigilando sobre un tronco seco de sauce.

Muy frecuentes de observar en selvas, montes, palmares y sabanas, este pájaro se suele alimentar del fruto de la mora entre otros componentes de su dieta.

Foto (E&N)



Un Pepitero de Collar estaba bebiendo agua de un charco.

Este hermoso pájaro de pico robusto es observado con poca frecuencia.

En su dieta incluye frutos de mora.

Foto (E&N)



El Celestino Común es muy llamativo por su color poco habitual entre los pájaros. Se lo ha observado consumiendo mora. Foto (E&N)



El Carpintero Blanco frecuenta montes y arboledas. Es bastante arisco siendo difícil la observación cercana. En su dieta incluye frutos de mora. Foto (E&N)



Tabla de Resultados

Especie de ave	Fruto consumido
Calancate común (<i>Aratinga acuticaudata</i>)	Mora
Benteveo común (<i>Pitangus sulphuratus</i>)	Mora
	Pino
	Tala salada
Boyerín (<i>Icterus cayanensis</i>)	Mora
Brasita de fuego (<i>Coryphospingus cucullatus</i>)	Mora
Calandria grande (<i>Mimus saturninus</i>)	Coco
	Mora
Cardenal (<i>Paroaria coronata</i>)	Mora
	Tala salada
Carpintero de los cardones (<i>Melanerpes cactorum</i>)	Mora
Carpintero blanco (<i>Melanerpes candidus</i>)	Mora
Carpintero real (<i>Colaptes melanochloros</i>)	Mora
Celestino común (<i>Thraupis sayaca</i>)	Mora
Cortarramas (<i>Phytotoma rutila</i>)	Tala salada
Cotorra (<i>Myiopsitta monachus</i>)	Coco
	Mora
Chingolo (<i>Zonotrichia capensis</i>)	Mora
Fiofio de pico corto (<i>Elaenia parvirostris</i>)	Coco
	Fruta tinta
	Mora
	Tala salada
Fiofio grande (<i>Elaenia spectabilis</i>)	Mora
	Tala salada
Jilguero dorado (<i>Sicalis flaveola</i>)	Mora
Monterita de cabeza negra (<i>Poospiza melanoleuca</i>)	Mora
	Tala salada
Naranjero (<i>Thraupis bonariensis</i>)	Mora
	Naranjillo
Pepitero de collar (<i>Saltator aurantirostris</i>)	Coco
	Mora
Pepitero gris (<i>Saltator coerulescens</i>)	Mora
Suirirí (<i>Suiriri suiriri</i>)	Mora
Tijereta (<i>Tyrannus savana</i>)	Mora
Tordo músico (<i>Agelaioides badius</i>)	Mora
Tordo renegrado (<i>Molothrus bonariensis</i>)	Mora
Tuquito gris (<i>Empidonomus aurantiatirocristatus</i>)	Mora
Viudita chaqueta (<i>Knipolegus straticiceps</i>)	Coco
Zorzal chalchalero (<i>Turdus amaurochalinus</i>)	Mora
Zorzal chiguanco (<i>Turdus chiguanco</i>)	Coco
	Mora

BIBLIOGRAFÍA

Demaio, P., U.O. Karlín y M. Medina. 2002. Árboles nativos del centro de Argentina. L.O.L.A. Buenos Aires.
 Pensiero, J. y M.R. de la Peña. 1999-2000. Flora y fauna de la provincia de Santa Fe. El Litoral. Santa Fe.
 de la Peña, M.R. y J. Pensiero. 2004. Plantas argentinas. Catálogo de nombres comunes. L.O.L.A.